




PARVOVIRUS CANINO

Guía completa para reconocer, actuar y prevenir

Una enfermedad viral altamente contagiosa que puede avanzar con rapidez, especialmente en cachorros y perros no vacunados o con vacunación incompleta.



URGENTE

Vómitos + diarrea + decaimiento

Mensaje clave

Ante la sospecha de parvovirus, contacta a tu médico veterinario de inmediato. La atención temprana mejora las posibilidades de recuperación.

Parvovirus canino: lo esencial

La enteritis por parvovirus canino es una infección gastrointestinal aguda causada por un virus muy resistente. Afecta con mayor frecuencia a perros jóvenes, no vacunados o con esquema incompleto. El virus tiene afinidad por células que se multiplican rápidamente, en especial las criptas intestinales y tejidos hematopoyéticos/linfoides.

Más vulnerables

- Cachorros
- No vacunados
- Esquema incompleto
- Refugios/criaderos
- Estrés o coinfecciones

Incubación

Los signos suelen aparecer alrededor de 5-7 días tras la infección, aunque pueden presentarse aproximadamente entre 2 y 14 días.

No es zoonosis

El parvovirus canino no se considera una enfermedad transmisible a las personas. La prioridad es evitar la exposición de otros perros susceptibles.

¿Qué ocurre dentro del organismo?



Epitelio intestinal de rápida división

1. Daño intestinal

La destrucción de las criptas reduce la renovación del epitelio, favoreciendo pérdida de líquidos, proteínas y alteración de la barrera intestinal.

2. Defensas comprometidas


Puede causar leucopenia y afectar tejido linfoide y médula ósea, aumentando el riesgo de infección bacteriana secundaria.

3. Deshidratación y shock

Vómitos y diarrea provocan pérdidas rápidas de agua y electrolitos. Los casos graves pueden evolucionar a hipoperfusión y shock.

La vía principal es fecal-oral

Un perro puede infectarse al ingerir partículas virales presentes en heces o en el ambiente. La transmisión también ocurre de forma indirecta a través de superficies, calzado, manos, correas, jaulas, patios, bebederos y otros objetos contaminados.



¿Por qué es tan difícil de eliminar?

Es un virus sin envoltura y resiste muchos detergentes/desinfectantes comunes. Puede permanecer viable durante semanas o meses; en condiciones favorables del exterior, incluso más tiempo.

Eliminación ambiental

Primero debe retirarse la materia orgánica. Luego se usa un desinfectante eficaz contra parvovirus. El Manual MSD cita, entre otras opciones, hipoclorito diluido 1:30.

Regla práctica de bioseguridad

LIMPIAR

DESINFECTAR

SECAR

AISLAR

No mezcles productos químicos. Respeta las instrucciones del fabricante, ventilación, tiempo de contacto y compatibilidad con la superficie.

Vómitos

Frecuentes o persistentes; dificultan la hidratación.

Diarrea

Líquida, muy maloliente y a veces con sangre.

Decaimiento

Apatía, debilidad, poca interacción y sueño excesivo.

Anorexia

Pérdida marcada del apetito y descenso de peso.

Fiebre / hipotermia

Puede haber fiebre; en shock, temperatura baja.

Deshidratación

Encías secas, debilidad y pérdida rápida de líquidos.

ALERTA DE URGENCIA

Acude a atención veterinaria inmediata si un cachorro o perro con vacunas incompletas presenta vómitos repetidos, diarrea (especialmente con sangre), decaimiento marcado, incapacidad para beber, encías pálidas, colapso o temperatura corporal anormal.

No esperes a que “se le pase”: la deshidratación y el shock pueden progresar rápidamente.

El diagnóstico combina clínica + pruebas

1

Historia y examen

Edad, estado vacunal, exposición, vómitos/diarrea, hidratación, dolor y perfusión.

2

Test de antígeno fecal

Prueba rápida frecuente en clínica. Un resultado debe interpretarse junto al cuadro clínico.

3

Hemograma

La leucopenia, linfopenia y neutropenia son hallazgos frecuentes y ayudan a valorar gravedad.

4

Bioquímica/electrolitos

Puede detectar hipoglucemia, alteraciones de sodio/potasio/cloro, proteínas y función orgánica.

5

PCR u otras pruebas

Puede utilizarse para confirmar en situaciones seleccionadas, especialmente si hay discordancia clínica.

Importante

Un test rápido negativo no siempre descarta la infección si la sospecha clínica es alta. El momento de la muestra, la cantidad de virus y la vacunación reciente pueden influir en la interpretación. La decisión corresponde al médico veterinario.

El objetivo es sostener al paciente mientras se recupera

El manejo depende de la gravedad. Muchos pacientes requieren hospitalización y aislamiento. El tratamiento se orienta a corregir deshidratación y alteraciones metabólicas, controlar náuseas/vómitos, aportar nutrición y prevenir o tratar complicaciones.

Fluidoterapia IV

Reposición de líquidos y electrolitos; ajuste según déficit y pérdidas.

Antieméticos

Control del vómito para facilitar hidratación y nutrición.

Soporte nutricional

La nutrición enteral temprana puede formar parte del manejo cuando el paciente lo tolera.

Antimicrobianos

Indicados en determinados pacientes por riesgo de translocación bacteriana/sepsis.

Control clínico

Temperatura, glucosa, electrolitos, perfusión, dolor, orina y evolución hematológica.

Terapias avanzadas

En casos seleccionados pueden considerarse plasma/sangre u otras medidas según criterio clínico.

No automedicar

No administres medicamentos humanos, antibióticos “sobrantes”, antidiarreicos ni remedios caseros sin indicación veterinaria. Algunos fármacos pueden ser tóxicos o retrasar el tratamiento adecuado.

La atención temprana hace una gran diferencia

Pronóstico

Según el Manual MSD, los perros tratados de forma intensiva en hospital suelen alcanzar tasas de supervivencia superiores al 90%; los protocolos ambulatorios publicados han comunicado resultados cercanos al 80% en contextos seleccionados. La gravedad individual puede variar considerablemente.

Antes del alta, pregunta por...

- Plan de alimentación y cantidad/frecuencia de agua.
- Medicamentos: dosis, horarios, duración y posibles efectos adversos.
- Signos que obligan a regresar de inmediato.
- Duración del aislamiento respecto de otros perros.
- Limpieza de superficies, patios, transportadoras y textiles.
- Cuándo retomar o completar el plan de vacunación.

Evita contagiar a otros perros

Aunque el paciente se vea mejor, sigue las indicaciones de aislamiento y desinfección. No compartas platos, camas, correas o espacios con perros susceptibles hasta recibir autorización veterinaria.

La vacunación es la medida preventiva más eficaz

Las vacunas frente a parvovirus forman parte de las vacunas esenciales (“core”) del perro. La pauta exacta debe definirla el médico veterinario según edad, riesgo, producto utilizado, antecedentes y contexto epidemiológico.



Referencia WSAVA 2024: iniciar no antes de las 6 semanas y revacunar cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; en escenarios de alto riesgo puede continuarse hasta las 20 semanas. Después se recomienda un refuerzo alrededor de los 6 meses y posteriores refuerzos según guía/producto.

Hasta completar el esquema

Evita zonas de alto riesgo

Parques caninos, patios muy transitados, heces de otros perros y lugares con historial de brotes.

Socialización segura

La socialización es importante: planifícala en entornos controlados y con perros sanos/vacunados, según consejo veterinario.

Higiene

Limpia calzado, transportadoras y superficies si hubo exposición. Evita trasladar contaminación entre hogares.

Acciones inmediatas



Llama antes de llegar

Informa que sospechas parvovirus para que la clínica prepare aislamiento y reduzca exposición.



Separa al paciente

Evita contacto con otros perros y no compartas utensilios.



No lo obligues a comer/beber

Si vomita repetidamente, forzar ingesta puede empeorar el cuadro. Sigue instrucciones veterinarias.



Lleva antecedentes

Carnet de vacunas, fecha de inicio de signos, número de vómitos/diarreas, medicamentos y posibles exposiciones.



Limpia con criterio

Retira materia orgánica antes de desinfectar y utiliza productos efectivos frente a parvovirus.

Mitos frecuentes

“Si no hay sangre, no es parvo”

Falso. Una parte de los pacientes puede presentar diarrea no hemorrágica.

“Un desinfectante común basta”

Falso. El virus resiste muchos productos; hay que usar un desinfectante eficaz y limpiar primero.

Principales fuentes clínicas

Manual Veterinario MSD (2025)

Infección por parvovirus canino (enteritis parvoviral en perros). Diagnóstico, hallazgos clínicos, tratamiento, pronóstico y desinfección.

<https://www.msdsvetmanual.com/es/aparato-digestivo/enfermedades-infecciosas-del-aparato-digestivo-en-pequeños-animales/infección-por-parvovirus-canino-enteritis-parvoviral-en-perros>

WSAVA Vaccination Guidelines (2024)

Pautas globales de vacunación: vacunas esenciales, inicio de serie en cachorros y refuerzos.

<https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/>

Hospital Veterinario Puchol

Material divulgativo sobre parvovirus canina y prevención.

<https://hospitalveterinariopuchol.com/noticias/parvovirus-canina-parvo/>

Purina Chile

Información general para tutores sobre parvovirus, signos y prevención.

<https://purina.cl/purina/perros/parvovirus-en-perros>

Vet Las Condes

Artículo educativo sobre contagio, síntomas y protección.

<https://vetlascondes.cl/blogs/blogs/parvovirus-en-perros-que-es-como-se-contagia-y-como-proteger-a-tu-mascota>

Uso responsable

Este documento es material educativo y no sustituye una consulta, diagnóstico ni tratamiento veterinario. Ante vómitos, diarrea, decaimiento o sospecha de parvovirus, consulta de forma urgente.

